

La Bondrée apivore

– *Pernis apivorus* –



Espèce oiseaux
Code Natura 2000 :
UE A072



La bondrée apivore est un rapace diurne de taille moyenne, de la famille des accipitridés (*Accipitridae*)

« Apivore » signifie : se nourrir d'abeilles. Pourtant il semble que, malgré son nom, la bondrée apivore consomme rarement des abeilles

IDENTIFICATION

La bondrée apivore ressemble à de nombreux rapaces. L'adulte présente une petite tête qui peut faire penser à celle d'un pigeon. La coloration et les dessins du plumage sont très variables d'un individu à l'autre, allant du très sombre au très pâle. Cependant, dans presque tous les cas, le dessous du corps et des ailes est ponctué plus ou moins densément de noir, les points étant alignés avec une régularité symétrique. Le trait du plumage le plus caractéristique de la bondrée adulte est la présence de trois barres sombres très marquées sur la queue, bien visibles lorsque celle-ci est étalée.



BIOLOGIE - ECOLOGIE

Activité

La bondrée apivore est un grand migrateur, qui arrive en Europe tardivement et repart précocement, si bien que son séjour chez nous ne dure que quatre mois, ne lui laissant que le temps nécessaire pour nicher. Elle est nettement grégaire lors de ses migrations, mais elle peut également voyager seule. En dehors des périodes migratoires, c'est un oiseau discret, et elle passe facilement inaperçue lors de son court séjour estival. Elle vit alors en couples disséminés.

Régime alimentaire

La bondrée apivore se nourrit principalement de guêpes et de larves d'hyménoptères - bourdons, guêpes - dont elle recherche le nid qu'elle déterre en creusant le sol. Au printemps, lorsque les couvains sont peu développés, elle consomme alors des petits rongeurs, des œufs, des jeunes oiseaux, des grenouilles et des petits reptiles. Occasionnellement, elle se nourrit de petits fruits.

Cycle de vie et Reproduction

Les couples, fidèles pour la vie, semblent déjà formés dès le retour de migration, et la reproduction commence aussitôt, avec les parades aériennes et la construction du nid. Les deux adultes défendent un territoire de 10 km² en moyenne. La nidification a lieu dans de grands arbres, rarement en dessous de neuf mètres, aussi bien en pleine forêt qu'en lisière. La ponte, en juin ou juillet, est presque toujours de deux œufs. Le premier vol des jeunes se situe à l'âge de 40 jours, mais ceux-ci retournent au nid pour y recevoir leur nourriture pendant deux semaines encore. A huit semaines (août ou début septembre), ils quittent les environs de l'aire, et la migration suit aussitôt, sans délai apparent.

Habitat

La bondrée apivore semble préférer la présence alternée de massifs boisés et de prairies. Elle évite les zones de grande culture, mais occupe aussi bien le bocage que les grands massifs forestiers, résineux ou feuillus. Pour se nourrir elle explore les terrains découverts et semi-boisés (lisières, coupes, clairières, etc.). La présence de zones humides, de cours d'eau ou de plans d'eau est fréquente sur son territoire. En hiver, elle occupe les forêts tropicales.



HABITAT D'INTERET COMMUNAUTAIRE ASSOCIE

Cette espèce peut être rencontrée dans de nombreux habitats d'intérêt communautaire. Parmi eux, les landes et fourrés tempérés (40..), les formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d'emboisement (62..), les hêtraies acidophiles atlantique à sous-bois à houx et parfois if (9120) ou les forêts alluviales à aulne et frêne (91E0*) sont susceptibles d'être concernés par cette espèce.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

La bondrée apivore niche en Europe moyenne et septentrionale. La limite sud de répartition passe par le nord de l'Espagne, le midi de la France, l'Italie moyenne et le nord de la Grèce. Vers le nord, elle atteint la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie, jusqu'au cercle polaire. Elle est totalement absente d'Europe en hiver et se répartit alors dans la zone forestière d'Afrique tropicale. La bondrée se reproduit dans la majeure partie de la France excepté le bassin méditerranéen et la Corse.

CONSERVATION

Etat des populations

Largelement répandue, relativement abondante et avec des effectifs français et européens probablement stables, la bondrée apivore ne semble pas menacée, que ce soit à l'échelle de la Bretagne, de la France ou de l'Europe.

Menaces

La bondrée apivore ne semble pas avoir connu de régression de ses effectifs aussi importante que les autres rapaces. Quoiqu'il en soit, la dynamique de l'espèce est à l'évidence très dépendante de l'évolution du milieu forestier comme des populations d'hyménoptères. En Bretagne, si la progression récente de la couverture forestière lui est favorable, on ignore tout des changements d'abondance que pourraient connaître les guêpes sociales sur le long terme (prédation, insecticides, etc.).

Mesures de conservation

La conservation de la bondrée n'implique pas de mesures de gestion draconiennes. Il convient simplement d'être vigilant sur certains points :

- Eviter la disparition du bocage et des haies vives ;
- Maintenir ou favoriser les clairières, les friches, les mares et les marais en bon état de conservation ;
- Conserver des mosaïques paysagères, alternance de milieux ouverts et de milieux forestiers ;
- Eviter les plantations monospécifiques denses (résineux notamment)
- Maintenir des forêts claires
- Eviter les travaux forestiers entre le 1^{er} mai et le 1^{er} septembre autour du site de nidification
- Eviter l'usage de pesticides

STATUT DE L'ESPECE

La bondrée apivore bénéficie de nombreux statuts de protection et de réglementation au niveau national, européen et international :

- Directive Oiseaux : annexe I
- Convention de Washington (CITES) : annexe A
- Convention de Bonn : annexe II
- Convention de Berne : annexe II
- Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection



ZOOM SUR LE SITE NATURA 2000 : LA VALLEE DU CANUT

La bondrée apivore a été observée à plusieurs reprises sur le site Natura 2000 depuis 2003. Toutefois, elle n'est pas identifiée comme nicheuse sur la Vallée du Canut malgré des habitats favorables.

Sources :

- Cahiers d'habitats Natura 2000 (tome 8)
- Livre : L'atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne, du Groupe Ornithologique Breton, Editions Delachaux et Niestlé.
- Site internet : www.oiseaux.net
- Rapports : Etude ornithologique – La Vallée du Canut – Printemps 2003 et 2004, Ligue pour la Protection des Oiseaux d'Ille-et-Vilaine, 2003 et 2004

Crédits photographiques (de haut en bas) : F. Hémary, R. Dumoulin – oiseaux.net, L. Casiano – oiseaux.net et A. Audevard- oiseaux.net.

LOCALISATION SUR SITE

